

# インフルエンザHAワクチンの予防接種をご希望の方に

(成人接種用)

## 1.インフルエンザと合併症

インフルエンザウイルスは、患者様の咳やくしゃみにより、空気中に浮かんだり、手についたりして、気道に感染します。感染して、1～5日すると、体のだるさ、急な発熱、のどの痛み、咳、くしゃみなどが出始めますが、普通は約1週間で治ります。インフルエンザにかかると、特に、肺や心臓の悪い方、高血圧、糖尿病、腎臓に病気のある方、高齢者の方には、肺炎、気管支炎を合併して入院が必要となる事があります。

## 2.ワクチンの効果と副反応

ワクチン接種を受けていれば、インフルエンザに感染しても症状が軽くすみます。重症化し入院することを予防する効果は30%～70%程度といわれています。ワクチン接種に伴う副反応として、発熱したり、注射部位が赤くはれたり、硬くなったります。発生頻度として発熱は100人に数人くらい、赤くはれたりするのは10人に1人くらいです。

## 3.次の方はワクチン接種を受けないでください

- 1) 明らかに発熱している方(通常37.5℃をこえる場合)
- 2) 重い急性疾患にかかっている方
- 3) 本剤の成分により、過敏症(アナフィラキシー)を起こしたことがある方
- 4) その他、かかりつけ医にワクチンを受けない方がいいといわれた方

## 4.次の方は接種前に医師にご相談ください

- 1) 風邪症状の方(微熱、咳、のどの痛み等)
- 2) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患及び血液疾患などの基礎疾患のある方
- 3) 妊娠している方
- 4) 過去に予防接種を受けたとき、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状のみられた方
- 5) 薬の投与または食事(鶏卵、鶏肉など)で発疹が出たり異常をきたしたことがある方
- 6) 過去にけいれんの既往歴のある方
- 7) 過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある方

「インフルエンザHAワクチン接種予診票」にご記入の上、医師の診察をお受けください。もし、普段と変わったことがあれば、医師にご相談ください。

社会医療法人

太秦病院

TEL 075-811-7711

附属 うずまさ診療所

TEL 075-863-6152

附属 うずまさ第二診療所

TEL 075-863-5581